

RSM 8.1.4**70% Gräser / 30% Kräuter & Leguminosen**Ansaatstärke: 5 g/m² / bei Erosionsgefahr bis 15 g/m² (in der Variante 85% Gräser / 15% Kräuter)

| Gräser | | % |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Agrostis capillaris | Rot-Straußgras | 5,00 |
| Anthoxanthum odoratum | Ruchgras | 5,00 |
| Bromus hordeaceus | Weiche Tresse | 5,00 |
| Cynosurus cristatus | Kammgras | 5,00 |
| Festuca brevipila | Raublatt-Schwingel | 20,00 |
| Festuca nigrescens | Horst-Schwingel | 15,00 |
| Festuca rubra subsp. rubra | Rot-Schwingel | 10,00 |
| Poa nemoralis | Hain-Rispe | 3,00 |
| Poa trivialis | Gew. Rispe | 2,00 |
| Leguminosen | | |
| Lotus corniculatus | Gew. Hornklee | 0,30 |
| Kräuter | | |
| Achillea millefolium | Gew. Schafgarbe | 0,80 |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 1,00 |
| Agrostemma githago | Kornrade | 2,00 |
| Ajuga reptans | Kriech-Günsel | 0,20 |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | 0,20 |
| Centaurea cyanus | Kornblume | 2,00 |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1,50 |
| Crepis biennis | Wiesen-Pippau | 1,00 |
| Galium mollugo | Wiesen-Labkraut | 1,50 |
| Galium verum | Echtes Labkraut | 0,50 |
| Hypericum perforatum | Tüpfel-Hartheu | 1,50 |
| Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 1,00 |
| Leucanthemum ircutianum | Zahnöhrchen-Margerite | 1,50 |
| Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 0,50 |
| Malva moschata | Moschus-Malve | 1,50 |
| Papaver rhoeas | Klatsch-Mohn | 1,50 |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 1,50 |
| Prunella vulgaris | Gew. Braunelle | 1,50 |
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2,00 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,50 |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | 1,00 |
| Silene vulgaris | Gew. Leimkraut | 1,00 |
| Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 2,00 |
| Summe | | 100,00 |